

La EEE y la fumigación aérea

Las preguntas más frecuentes

SOBRE EEE

¿Qué es el virus de la encefalitis equina del este (EEE, por sus siglas en inglés)?

La EEE es una enfermedad rara pero grave, causada por un virus propagado por mosquitos infectados. El virus EEE puede causar inflamación del cerebro (encefalitis). En los Estados Unidos, se informan aproximadamente 5-10 casos de EEE en humanos anualmente. Es una de las enfermedades más graves transmitidas por mosquitos en los Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), aproximadamente un tercio de los casos humanos de EEE son fatales.

¿Cuántos casos totales de EEE hay en Michigan?

Hasta el 27 de septiembre de 2019, ha habido nueve (9) casos en seis (6) condados de Michigan incluidos: Kalamazoo, Berrien, Barry, Cass, Calhoun y Van Buren. Tres (3) de esos casos resultaron en la muerte. Además, el EEE ha sido identificado en 27 animales. Los casos de animales se identificaron en 13 condados diferentes, incluidos: Barry, Berrien, Calhoun, Cass, Genesee, Jackson, Kalamazoo, Kent, Lapeer, Montcalm, Newaygo, St. Joseph y Van Buren.

Para más información, visite a: www.Michigan.gov/EEE

¿Por qué hay casos de EEE en Michigan?

Michigan ha tenido brotes de EEE aproximadamente en cada década desde 1980. Este año, el número de casos humanos de EEE en Michigan es igual al número total de casos en el año combinado. No se sabe exactamente por qué ciertos años son más fuertes que otros, pero se considera que el clima, incluyendo la temperatura y la lluvia tienen que ver.

¿Cómo se infectan las personas con EEE?

EEE se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. No se puede contraer la EEE directamente de otra persona o de un animal como un caballo o un venado.

¿Quién está en riesgo de infección con EEE?

Cualquier persona que se encuentre en una zona donde el virus está circulando en los mosquitos puede infectarse con EEE. El mayor riesgo es para las personas que viven u visitan zonas forestales, y para las personas que trabajan o realizan actividades al aire libre, debido a una mayor exposición a los mosquitos potencialmente infectados. Las personas mayores de 50 años tienen un mayor riesgo de infección.

¿Qué tan pronto se enferman las personas después de ser picadas por un mosquito infectado?

Los síntomas de EEE tardan entre 4 y 10 días en presentarse después de la picadura por el mosquito infectado.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad EEE?

Los casos graves de infección por EEE comienzan con la aparición repentina de dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos y vómitos. La enfermedad puede progresar a desorientación, convulsiones y coma. Aproximadamente un tercio de los pacientes que desarrollan EEE mueren, y muchos de los que sobreviven quedan con un leve a grave daño cerebral.

¿Cómo se puede hacer la prueba de EEE?

Las personas que han sido picadas por mosquitos pueden monitorear su salud y hablar con sus proveedores de atención médica si desarrollan síntomas como fiebre, malestar general, dolor de cabeza y confusión. Las pruebas de EEE no son necesarias en una persona que no muestra signos compatibles con enfermedad.

¿Cómo se diagnostica el EEE?

El diagnóstico se basa en pruebas de sangre o líquido cefalorraquídeo. Estas pruebas generalmente buscan anticuerpos que el cuerpo produce contra la infección viral.

¿Cuál es el tratamiento para el EEE?

No existe un tratamiento específico para el EEE. Los antibióticos no son efectivos contra los virus, y no se han descubierto medicamentos antivirales efectivos. Las enfermedades graves se tratan con terapia de apoyo que puede incluir hospitalización, asistencia respiratoria, fluidos intravenosos y prevención de otras infecciones.

¿Cómo pueden las personas reducir la posibilidad de infectarse con EEE?

- Evitar estar al aire libre entre el anochecer y el amanecer, cuando los mosquitos portadores del virus EEE están más activos.
- Aplicarse, a la piel expuesta o a la ropa, repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET u otros productos registrados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y siempre siga las instrucciones de uso del fabricante.
- Usar camisas de manga larga y pantalones largos cuando esté al aire libre. Aplicar repelente de insectos a la ropa para ayudar a prevenir las picaduras.
- Dejar protegidas las ventanas y puertas para ayudar a mantener afuera a los mosquitos.
- Vaciar el agua en los criaderos de mosquitos por la casa, sitios como cubos, piscinas para niños sin usar, llantas viejas y otros lugares en los que puedan poner huevos los mosquitos.
- Usar redes y/o ventiladores en las áreas para comer al aire libre.

¿Puedo enfermarme al comer carne de venado si está infectada con EEE?

Si un animal parece estar enfermo, no se debe consumir la carne de ese animal, ya que hay otras enfermedades que pueden transmitirse. Para matar posibles patógenos, la carne de caza debe cocinarse completamente a una temperatura interna de 165 grados F, medida con un termómetro para carne.

¿Mi mascota puede contraer la EEE?

La EEE no es común en perros y gatos, sin embargo, cuando se ha identificado en perros, generalmente tienen menos de seis meses. Los caballos son muy susceptibles a la EEE y aproximadamente el 90 por ciento de los caballos que muestran signos de EEE mueren a causa de la enfermedad. Hay una vacuna disponible para caballos.

¿Cómo protejo a mis mascotas de la EEE?

Mantenga a las mascotas adentro tanto como sea posible entre el anochecer y el amanecer, cuando los mosquitos están más activos. Los repelentes de mosquitos etiquetados para uso en personas no deben usarse en mascotas. Hay algunos productos tópicos que se pueden aplicar a los perros para protegerlos de los mosquitos; los dueños de mascotas que estén interesados deben colaborar con su veterinario.

SOBRE LA FUMIGACIÓN DE MOSQUITOS EN MICHIGAN

¿Cuál es el propósito de rociar insecticidas en el aire de zonas de Michigan?

La fumigación aérea puede reducir rápidamente la cantidad de mosquitos en un área geográfica grande, lo cual puede reducir el riesgo de exposición al virus EEE. Cuando se lleva a cabo siguiendo regulaciones estrictas, la fumigación es segura para las personas, los animales y el medio ambiente y se la ha utilizado con éxito en los Estados Unidos durante décadas para reducir las poblaciones de mosquitos.

¿Cómo ocurrirá la fumigación de insecticidas?

Los profesionales de control de mosquitos aplicarán insecticidas aprobados como aerosoles de volumen ultra bajo (ULV) desde un avión bimotor que vuela a aproximadamente 300 pies sobre la tierra. Los pulverizadores ULV dispensan gotitas de aerosol muy finas. Las gotitas, que son más pequeñas que la cabeza de un alfiler, se desplazan por el aire para matar a los mosquitos adultos al contacto.

¿En dónde y cuándo será la fumigación aérea?

La fumigación aérea se llevará a cabo en áreas donde hay una concentración de casos de EEE en humanos y animales. El día de la fumigación, la aplicación empezará después del anochecer, aproximadamente a las 8 pm, y continuará a lo largo de la noche o hasta que las condiciones atmosféricas ya no sean propicias. El control de mosquitos depende del clima. Las velocidades del viento, las temperaturas y la precipitación a nivel del suelo o en el aire pueden afectar la fumigación.

Para información actualizada del área de aplicación, visite www.michigan.gov/EEE

¿Cómo se verá la fumigación para mí, como residente, si estoy afuera cuando ocurre?

Los residentes probablemente no notarán la fumigación cuando ocurra. Un avión bimotor que vuela a unos 300 pies sobre el nivel de la tierra aplicará una cantidad mínima del producto, aproximadamente 1 cucharada por acre (que es del tamaño de un campo de fútbol). Es posible que ni siquiera vea o escuche el avión, o sienta el producto en el aire, cuando se está aplicando.

¿Qué insecticida se está usando?

El producto que se usa se llama Merus 3.0. Es un insecticida orgánico botánico para el mosquito adulto que está registrado por la EPA y contiene cinco por ciento de las piretrinas que se encuentran naturalmente en las flores de crisantemo. Las piretrinas se usan comúnmente para controlar mosquitos, pulgas, moscas, polillas, hormigas y muchas otras plagas y se han registrado para su uso en insecticidas desde la década de 1950. Merus 3.0 está listado en el OMRI y se puede usar alrededor de cultivos y jardines orgánicos.

El Certificado de OMRI: <https://www.omri.org/mfg/cmc/certificate/10513>

¿Merus 3.0 causará efectos adversos en la salud en las personas?

Merus 3.0 está registrado en la EPA y está etiquetado para uso de salud pública en áreas residenciales. En general, no se esperan riesgos a corto o largo plazo para la salud humana durante o después de la fumigación.

¿Debo evitar exponerme a los productos químicos que se fumigan?

En general, no se requiere tomar acciones especiales antes o durante la fumigación. Si está preocupado o tiene susceptibilidad, se puede reducir su exposición de las siguientes maneras:

- Permanecer dentro durante las horas de la fumigación.
- Cerrar ventanas y puertas. Apagar los aires acondicionados y los ventiladores de las ventanas que introducen aire del exterior.
- Meter objetos de afuera (lavandería, muebles de patio y juguetes para niños) o cubrirlos si es posible.
- Mantener a las mascotas adentro y cubrir las piscinas y estanques de peces, si es posible.

¿Qué hacer si estuviera afuera al momento de la fumigación, y estuviera preocupado con la exposición a la fumigación?

En general, no se esperan efectos en la salud por estar afuera durante o después de la fumigación. Algunas acciones para tomar si le preocupa la misma incluyen:

- Lavarse la piel y/o ropa con agua y jabón detergente.
- Enjuagarse los ojos con agua.
- Consultar a su proveedor de atención médica si le preocupa su salud.

¿Cuánto duran estos químicos en el medio ambiente?

El Merus 3.0 se descompondrá con el tiempo. No es necesario tomar medidas especiales la mañana después de la fumigación; sin embargo, si le preocupa el contacto con los restos de residuos químicos, podría:

- Enjuagar las frutas y verduras de cosecha propia antes de cocinarlas o comerlas.
- Lavar las superficies y objetos exteriores con agua y jabón para eliminar los productos químicos residuales.

¿La fumigación contaminará mi Fuente de agua potable?

El Merus 3.0 se asimila fuertemente al suelo, por lo que es probable que pueda entrar en el agua subterránea. Los depósitos de agua potable no están incluidos en la zona fumigada. El Merus 3.0 se descompone rápidamente en las aguas superficiales. Debido a estos factores, no se espera encontrar al Merus 3.0 en su agua potable.

¿Qué sucede si creo que estoy experimentando una reacción adversa a la fumigación?

Si cree que está experimentando cualquier afecto de salud por la fumigación, llame a su proveedor médico o al Centro de Control de Envenenamiento de Michigan al (800) 222-1222. Si los síntomas son graves, llame al 911 para recibir asistencia.

¿El Merus 3.0 puede dañar a las mascotas o al ganado?

Según la etiqueta, no hay efectos en la salud listados para las mascotas o para el ganado que tengan contacto directo con el químico rociado. Los propietarios de animales que estén preocupados pueden reducir la exposición manteniendo a las mascotas y los animales de granja adentro. Llevar los animales al interior al anochecer y al amanecer, cuando están más activos, puede protegerlos de los mosquitos que transportan EEE. Los propietarios de ganado siempre deben consultar con sus veterinarios con respecto a la salud y el bienestar general de sus animales.

¿El Merus 3.0 puede dañar a mis abejas?

Según la etiqueta, Merus 3.0, una piretrina, es tóxica para las abejas que tengan contacto directo con cultivos en flor o malezas. La aplicación realizada por la noche minimizará el riesgo para los recolectores diurnos, como las abejas. El producto se secará rápidamente y no debe representar un riesgo a largo plazo. Los apicultores que desean minimizar el riesgo de que el producto tenga contacto con una colonia puede reducir las entradas de sus colonias para minimizar el movimiento aéreo a una colonia o cubrirlas durante una aplicación con un trapo húmedo, también se recomienda una arpillera. Por lo general se puede liberar a las abejas para forrajear durante el día después de la aplicación, siempre que los residuos de la aplicación se hayan secado.

¿Pueden los residentes optar por no participar en la fumigación aérea?

Actualmente estamos en una emergencia de salud pública y las fumigaciones aéreas brindan la opción más efectiva para suprimir el brote al reducir las poblaciones de mosquitos. Debido a la altura y la velocidad de operación del avión, no es posible detener la fumigación sobre una sola propiedad. Si una persona desea optar por no participar en la aplicación, según las reglas de MDARD, no se rociará un área de 1,000 x 1,000 pies alrededor de su residencia. Esto reducirá la efectividad general del tratamiento en el área, las poblaciones de mosquitos que se encuentren a favor del viento alrededor del área de exclusión no se reducirán y los vecinos no se beneficiarán de la reducción en el número de mosquitos.

Antes de ejercer esta opción, recuerde que la EEE es muy mortal y que esta fumigación aérea no conlleva ningún riesgo significativo para la salud humana. Si bien no es necesario hacerlo, puede reducir aún más su exposición si permanece en el interior y cierra las ventanas y puertas. Si, por alguna razón, aún prefiere que no se realice la fumigación en su zona, puede enviar un correo electrónico con su nombre y dirección residencial completa a eee@michigan.gov. La solicitud de no participar en la fumigación debe recibirse al menos 48 horas antes de que comience la fumigación

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para obtener información actualizada sobre EEE en Michigan, incluido el recuento de casos, visite www.Michigan.gov/EEE

Para obtener información general de salud, relacionada con EEE, visite: www.cdc.gov/EEE

Para obtener información sobre la fumigación en su condado: se proporcionarán actualizaciones a través de los medios de comunicación locales, las redes sociales y otros canales 48 horas antes de que ocurra la fumigación.

Para preguntas relacionadas con la salud, comuníquese con MDHHS al: (517) 335-8165

